

Blattanex[®]

GEL



Aplicación segura y eficiente

para el control de cucarachas

Características y beneficios:

- Listo para usar.
- Efecto dominó. Después de la ingestión de Blattanex, las cucarachas vuelven a sus refugios a causa de sus patrones de comportamiento de consumir excreciones como excrementos, y cadáveres, Blattanex permanece y puede extender su efecto insecticida al resto de la colonia.
- Alta efectividad: por cada cucaracha que consume el cebo, se eliminan otras 50
- Control efectivo a largo plazo, ya que permanece activo y apetecible por más de 45 días.
- Gel insecticida desarrollado considerando las preferencias alimentarias de la mayoría de las cucarachas, por ello presenta un alto grado de aceptación.
- Ideal para áreas sensibles, no quedan trazas en el entorno después de la aplicación, altamente recomendado para sitios en los que existe restricción de aplicación de insecticidas líquidos por posibles daños eléctricos o restricciones de humedad. Puede ser aplicado incluso en presencia de personas o animales.
- Alto rendimiento, con solo 5 gramos se puede tratar 50 m², sin olor ni manchas.



Especificaciones Técnicas

Grupo químico	Ingrediente activo	Concentración	Formulación	Modo de acción	Categoría toxicológica
Neonicotinoide	Imidacloprid	2,15%	Gel	Ingestión	III Moderadamente Tóxico

Dosis y Plagas

Blattanex® Gel Cucarachicida no requiere preparación previa porque es listo para uso.

Plaga	Dosis
Todo tipo de cucarachas: Blattella germanica Periplaneta americana Blatta orientalis Supella longipalpa Periplaneta australasiae Periplaneta fuliginosa Pycnoscelus spp. Blaberus spp. Parcoblatta spp.	1 a 3 gotas por m ² o lineal. Para cucarachas grandes de 2 a 3 gotas por m ² Para cucarachas pequeñas de 1 a 2 gotas por m ²

Recomendaciones de uso

Blattanex® Gel Cucarachicida no requiere preparación previa porque es listo para uso. Es de fácil aplicación, de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

- Antes de la aplicación del producto limpie el área a tratar.
- Remueva la tapa de la punta de la jeringa, presione suavemente el embolo hasta formar una pequeña gota en la punta. Una gota de gel de 5 mm de diámetro equivale aproximadamente a 0.1 g de producto.
- Coloque la gota formada de gel sobre la superficie en la que se requiere hacer el control.
- Verifique el consumo y estado del cebo y reemplace el cebo de ser necesario. Continúe la aplicación hasta la desaparición de los signos de infestación.
- Se recomienda aplicar tratamiento de mantenimiento para evitar reinfestaciones.

Se debe aplicar en los sitios donde observe la presencia de cucarachas:

- En grietas, hendiduras y rendijas de las estructuras de equipos y áreas, repisas y gabinetes.
- Bajo cubiertas de mesas.
- Detrás y debajo de equipos como refrigeradores, hornos, electrodomésticos, computadores, etc.
- En ángulos de muros, cielos rasos, marcos de puertas y ventanas.
- Sobre y bajo campanas extractoras, entre otros.

Si el gel ha sido consumido en su totalidad y las cucarachas están todavía presentes, habrá que reemplazar los cebos.

Si el gel está presente sin haber sido consumido, la infestación está eliminada o bien, es necesario elegir nuevos sitios de cebado.



**Presentación:
jeringas de 5 g**

Blattanex[®]
GEL