



# QuickBayt®

## Versátil, efectivo y seguro

para el control de moscas

### Características y beneficios:

- Fácil aplicación, cebo listo para usar.
- Aplicación localizada, solamente en el lugar donde están las moscas.
- Fácil uso, contiene amargante para prevenir la ingestión humana.
- Acción rápida y prolongada.
- Excelente efecto de volteo.
- Potente atrayente.
- Versatilidad en uso, gracias a sus distintas formas de aplicación.



OTROS  
FORMAS DE APLICACIÓN



# Especificaciones Técnicas

Grupo químico	Ingrediente activo	Concentración	Formulación	Modo de acción	Categorías toxicológicas
Neonicotenoide	Imidacloprid	0,5%	Cebo Granulado (GB)	Ingestión	III Medianamente Tóxico

## Dosis y Plagas

Plagas	Dosis
Moscas	Cebo Seco: Utilice 200 g de QuickBayt para cubrir 100 m <sup>2</sup> de superficie. Cebo Líquido: Disuelva un sobre de Quick Bayt en 4 litros de agua. Cebo Pintado: Disuelva 100 g de Quick Bayt en 80 ml de agua tibia.

## Recomendaciones de uso


### Cebo Pintura



**Paso 1:** Disuelva 100 g de **Quick Bayt®** en 80 ml de agua tibia.



**Paso 2:** Mezcle hasta formar una solución homogénea.



**Paso 3:** Aplique con una brocha o cepillo en paneles plásticos de 20 x 30 cm o en superficies pintándola directamente.



**Paso 4:** Coloque los paneles en lugares frecuentados por las moscas. Coloque un panel cada 4 ó 5 m.

Recomendado para aplicar en áreas con niveles de infestación de moscas bajo a moderado. Efectivo por más de 4 semanas. Humedecer los paneles o superficies pintadas cada 15 días. 100 g de QuickBayt en cebo pintura tiene una cobertura de 50 m<sup>2</sup>.

### Cebo Seco

Utilice 200 g de QuickBayt para cubrir 100 m<sup>2</sup> de superficie.

Esparcir directamente de su empaque de forma lineal sobre superficies horizontales secas, sobre papel engomado por ejemplo: pasillos, marcos de ventana, etc. También se puede colocar el cebo sobre platos y colocarlos en lugares de alta influencia de moscas.

Inspeccionar periódicamente las cantidades de producto aplicado; si el cebo ha sido consumido por completo o hay moscas muertas encima de este, reemplace el cebo.

Repetir este procedimiento hasta que se observe reducción en la población de moscas.



### Cebo Líquido



**Paso 1:** Disuelva un sobre de **Quick Bayt®** en 4 litros de agua.



**Paso 2:** Agite hasta disolver los gránulos de **Quick Bayt®**.



**Paso 3:** Ubicar los cebaderos cada 10 – 20 m alrededor del área donde se quiere controlar la plaga.



**Paso 4:** Se captura gran cantidad de moscas entre 4 y 8 días. Es necesario retirar las muertas para poder continuar utilizando la solución.



Recomendado para controlar moscas con infestaciones severas en rellenos sanitarios, granjas avícolas, porcícolas, ganadería. Resultados altamente efectivos. Recambie la solución después de 8 días.

**Presentaciones: sobre 50 g**



**QuickBayt®**