



Temprid[®]
31.5 SC

Audaz y Novedosa fórmula dual-activa

controla más plagas en más lugares

Características y beneficios:

- *Doble efecto insecticida en un solo producto. Dos modos de acción: La sinergia del Beta-cyfluthrin con Imidacloprid, hace que actúe de dos formas diferentes, al mismo tiempo sobre el sistema nervioso del insecto.*
- *Amplio espectro biocida, combate plagas rastreras, voladoras y ocasionales, incluyendo plagas chupadoras y de jardín.*
- *Control de plagas en exteriores e interiores.*
- *Bajo olor y no mancha.*
- *Puede utilizarse en plantas ya que Temprid actúa por contacto y de manera sistémica.*
- *Efecto prolongado, excelente residualidad.*
- *Bajo costo de aplicación, alta rentabilidad, excelente relación costo/efectividad en el control por lo que se reducen las reaplicaciones y reclamaciones en los servicios.*
- *Producto ideal para programa de rotación, ideal para manejo de Tolerancia/Resistencia.*



Especificaciones Técnicas

Grupo químico	Ingrediente activo	Concentración	Formulación	Modo de acción	Categorías toxicológicas
Neonicotinoide y Piretroide	Imidacloprid y β -Cyfluthrina	31,5%	Suspensión Concentrada	Contacto e ingestión	III Medianamente Tóxico

Dosis y Plagas

Nombre común	Nombre científico	Dosis / L Agua/ 20m ²	Método de Aplicación	Area a tratar
Arañas	Loxosceles intermedia	2 ml	Aplicar con equipo aspersor con boquilla de abanico. Garantizar una presión del equipo de 50 psi	Aplicar en perímetros, grietas y escondrijos de cualquier tipo de instalación como restaurantes, panaderías, hoteles, aeropuertos, teatros, industrias alimenticias y no alimenticias, instalaciones rurales y pecuarias, centros comerciales, frigoríficos, medios de transporte, residencias, entre otros.
	Nesticodes rufipes			
Chinchas de cama	Cimex lectularius	2 ml		
Cucarachas	Blattella germánica	2 ml		
	Periplaneta americana			
Escorpiones	Tityus serrulatus	4 ml		
Garrapatas	Amblyomma sp	4 ml		
	Rhipicephalus sanguineus			
Hormigas	Camponotus spp	4 ml		
	Monomorium florícola	2 ml		
Moscas	Musca domestica	4 ml		
Mosquitos	Aedes aegypti	4 ml		
	Culex quinquefasciatus			
Pescadito de plata	Lepisma saccharina	2 ml		
Pulga	Ctenocephalides spp.	4 ml		

Recomendaciones de uso

Temprid® SC es prácticamente indetectable en su aplicación a excepción de las plagas, lo que permite que pueda ser aplicado sin preocupación, formando una barrera protectora en interiores y exteriores y en todo tipo de superficies manteniendo su efectividad sobre las plagas.

Temprid® SC no solo ha demostrado su efectividad en el control de plagas urbanas sino también en plagas que tienen un alto impacto económico y productivo en la industria pecuaria y avícola.

Periodo de Re-Ingreso

Este depende de algunas variables como son: área tratada, método de aplicación, ventilación y dosis. En términos generales se recomienda el reingreso al área 2 horas después de la aplicación. Si se aplica de forma focalizada se recomienda el reingreso al área entre 10 - 30 minutos después de la aplicación.



Presentación:
envase de 250 ml y 10 ml



Temprid®
31.5 SC