



Racumin[®] POLVO

Formulación única para el control de roedores

Características y beneficios:

- Alta eficacia en el control de las principales especies de roedores debido a su versatilidad en la aplicación.
- No genera rechazo ni alerta por parte de los roedores plaga debido a que no tiene olor ni sabor.
- Rodenticida de primera generación (dosis múltiple), lo cual hace que el roedor consuma el cebo con toda confianza. La muerte de los roedores ocurrirá en un periodo de 3 a 8 días.
- Debido a sus distintas alternativas de uso que permiten adaptarse a la instalación donde se requiere hacer el control. Puede utilizarse por espolvoreo en el tránsito de los roedores o en la preparación de cebos que compitan directamente con los alimentos que los roedores acostumbran consumir.



Especificaciones Técnicas

Grupo químico	Ingrediente activo	Concentración	Formulación	Modo de acción	Categoría toxicológica
Cumarínico	Coumatetralyl	0,75%	Polvo de Contacto (CP)	Ingestión	I Extremadamente Tóxico

Dosis y Plagas

Método de Aplicación	Dosis	Area a tratar
Espolvoreo Eparcir directamente sobre las superficies o aplicado con máquina de espolvoreo en la madriguera	50g / 20 m ²	Edificaciones, instalaciones de almacenamiento, bodegas, zonas industriales, canales de riego, depósitos de basuras, instalaciones pecuarias
Preparación de cebos Se sugiere para 20 Kg de cebo mezclar: - 1 Kg de Racumin Polvo - 18 Kg de maíz quebrado - 0.5 Kg de harina de pescado - 0.5 Kg de sorgo - 100 ml de esencia de vainilla	Preparación en proporción de 1:9 con cereales triturados como arroz, avena, maíz, sorgo, trigo, o con productos que sean la preferencia alimentaria de los roedores. Distribuir la mezcla en bolsas plásticas o de papel que contengan entre 10 y 20 g. Ubicar los cebos cada 5 - 10 m si la infestación es baja. Para infestaciones severas colocar los cebos cada 2 m.	

Recomendaciones de uso

Racumin® Polvo se recomienda aplicarlo por espolvoreo, puede esparcirse sobre superficies frecuentadas por los roedores como entrada a las madrigueras o guaridas y/o sendas de tránsito, también puede ser aplicado con una máquina de espolvoreo directamente a la madriguera. El producto se adhiere a las extremidades y cuerpo del animal, lo que asegura la intoxicación por vía digestiva al momento de asearse o acicalarse.

Se debe revisar periódicamente los lugares donde se realizó la aplicación de Racumin® Polvo y reponer o reforzar la capa de producto cuando sea necesario. Los roedores mueren a los 3-8 días después de haber ingerido el producto.

Importante monitorear los puntos de cebado cada 3 – 4 días para verificar consumo. Si el cebo fue consumido reemplace por uno nuevo. Después de 8 días reemplace el cebo así no hubiera consumo.

La aplicación de Racumin® Polvo debe realizarse con guantes y protección respiratoria. Los equipos o utensilios empleados en la preparación y mezcla de los cebos deben estar marcados y se deben utilizar exclusivamente para este trabajo.



**Presentaciones:
sobre 50 g y frasco de 1 Kg.**



**Racumin®
POLVO**