



Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Insecticida	Cloronicotinilo	Imidacloprid CAS 138261-41-3	2,15%
Formulación:	Modo de acción:	Presentación:	
Gel – Listo para usar	Por contacto e ingestión	Jeringas de 5 g.	

CATEGORÍA TÓXICOLÓGICA CAT IV

Beneficios y características:

- // Rápida reducción de las poblaciones de cucarachas.
- // Excelente adherencia a superficies
- // Color blanco que disimula su aplicación
- // Aplicación fácil y segura
- // Efecto dominó.
- // Contiene amargante para prevenir la ingestión humana y de mascotas domésticas.

Recomendaciones de uso:

Uso doméstico en el control de cucarachas. Actúa en el sistema nervioso de los insectos, afectando al receptor nicotínico de la acetilcolina causando el bloqueo completo de los impulsos nerviosos.

Dosis recomendadas

Plagas	Dosis
Todo tipo de cucarachas como: <i>Blattella germanica</i> <i>Periplaneta americana</i> <i>Blatta orientalis</i>	1 a 5 gotas por m ² o lineal. El volumen de aplicación depende del grado de infestación. La aplicación de un mayor número de gotas puede dar resultados más rápidos. Repetir la aplicación hasta que no se observen cucarachas.



Aplicación

Blattanex Gel para el control de cucarachas viene en jeringa plástica lista para uso.

- // Limpie el área a tratar antes de aplicar.
- // Remover el tapón que cubre la boquilla de la jeringa y aplicar el gel directamente a la superficie presionando suavemente el émbolo.
- // Se recomienda su aplicación en los siguientes sitios: grietas y/o lugares de refugio de las cucarachas, en cocinas, mesas, cajones, etc. esquinas o debajo de mesas donde se preparan alimentos; debajo y detrás de equipos eléctricos tales como refrigeradores, congeladores, motores, computadores, etc.
- // No aplicar el gel en los siguientes sitios: áreas que se laven en forma rutinaria o áreas recién tratadas con insecticidas de contacto.
- // No aplicar ningún otro producto sobre el gel, ya que puede causar efecto repelente al mismo tiempo.



Precauciones y advertencias de uso:

Blattanex 2,15 Gel para el control de cucarachas no representa riesgos para el usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben ser observados y aplicados en el uso de este producto.

Almacenamiento y conservación:

Conservar y transportar el Blattanex 2,15 Gel en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelos según la legislación y/o normas vigentes.



Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:

Inutilice los envases vacíos, perforelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

Información técnica sobre precauciones

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- // No arrojar residuos a los ríos. Tóxico para peces y crustáceos.



Manejo de intoxicaciones

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Sudoración, salivación excesiva, náusea, depresión, disnea, puede causar irritación y sensibilización en la piel.

Primeros auxilios:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.



NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: Blattanex 2,15 Gel no contiene antídoto, aplique tratamiento sintomático y de soporte.

