



Racumin[®] CEBO



Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Rodenticida	Cumarínico	Coumatetralyl CAS 5836-29-3	0,0375%
Formulación:	Modo de acción:	Presentación:	
Cebo- Listo para usar	Por ingestión	Sobre 100g y 50g.	

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA CAT IV



Racumin[®]
CEBO

Beneficios y características:

- // Listo para usar.
- // Alta palatabilidad.
- // Muerte paulatina y sin dolor (evita el rechazo al cebo).
- // Baja toxicidad para animales no meta.

Recomendaciones de uso:

Racumin Cebo es un preparado para uso en el control de roedores plaga. Actúa por ingestión inhibiendo la formación de protrombina bloqueando el mecanismo de coagulación de la sangre, lo que se traduce en hemorragias internas que son las que causan la muerte. Los roedores mueren de 4 a 7 días después de haber ingerido el cebo. No causa recelo en la población lo que permite que todas sigan consumiendo el cebo hasta lograr el control de la plaga.



Dosis recomendadas:

PLAGAS	DOSIS
Rata gris <i>Rattus norvegicus</i> , Rata negra <i>Rattus rattus</i> Ratón domestico <i>Mus musculus</i>	50- 100 g por punto de cebaje. Ubicar una estación de cebaje cada 10-12 m. En caso de alta infestación reducir la distancia entre los puntos de cebaje.

Aplicación

- // Cortar esta bolsa en su parte superior.
- // Coloque el cebo en un lugar frecuentado por los roedores.
- // Reponga el cebo hasta que no haya signos de infestación.
- // Cuando note que el cebo no se consume esto le indicará que los roedores han muerto.

El cebo debe cambiarse totalmente cada 8 días. No mezclar cebo viejo con nuevo. Colocar el cebo en los sitios donde se note la presencia de los roedores. No aplicar el cebo en lugares húmedos o en exteriores susceptibles a mojarse.

Precauciones y advertencias de uso:

Racumin Cebo 0,0375 no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.





Racumin[®]
CEBO

Almacenamiento y conservación:

Conservar y transportar Racumín Cebo 0,0375 en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.



Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACÍE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

Información técnica sobre precauciones

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- // No arrojar residuos a los ríos, lagos o estanques.





Racumin[®]
CEBO

Manejo de intoxicaciones

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Hemorragia de endas y nariz. Dolor abdominal. Aparición generalizada de hematomas.

Primeros auxilios:

POR INGESTIÓN: No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión reciente (< 3 horas), y si la persona está consciente **PROVOCAR EL VÓMITO**. Llamar a un médico inmediatamente trasladar al paciente a un centro hospitalario.

POR INHALACIÓN: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.



POR CONTACTO CON LOS OJOS:
Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
Intoxicaciones pueden tratarse eficazmente con la vitamina K-1.

Registro:

PAÍS	No. DE REGISTRO
Guatemala	PP-154
El Salvador	CAS. 95-10-78
Honduras	120-60-III
Nicaragua	BY-011E-8-97
Costa Rica	MSDST-022-PD
Panamá	73353
Rep. Dominicana	PH2008-0022
Cuba	055/19

